

[Início \(https://vipfarma.com.br/\)](https://vipfarma.com.br/) → [Hospitalar \(https://vipfarma.com.br/medicamentos-hospitalares.html\)](https://vipfarma.com.br/medicamentos-hospitalares.html) → [Zoladex 3,6mg com 1 seringa](#)



Zoladex 3,6mg com 1 seringa

SKU: 033515

[SEJA A PRIMEIRA PESSOA A AVALIAR ESTE PRODUTO](#)

EM ESTOQUE

R\$1.234,98

Informe seu CEP, para cálculo estimado do frete.

CEP

ANEXE O DOCUMENTO (RG OU CNH) *

Escolher arquivo

Nenhum arquivo escolhido

Extensões de arquivo permitidas para upload: **jpg, jpeg, png, pdf**

* Campos obrigatórios

-

1

+

COMPRAR

[ADICIONAR À LISTA DE DESEJOS](#)

([HTTPS://VIPFARMA.COM.BR/WISHLIST/INDEX/ADD/PRODUCT/33174/FORM_KEY/GKWMPOWEINTQKWS/](https://vipfarma.com.br/wishlist/index/add/product/33174/form_key/GKWMPOWEINTQKWS/))

[ADICIONAR PARA COMPARAR](#)

([HTTPS://VIPFARMA.COM.BR/CATALOG/PRODUCT_COMPARE/ADD/PRODUCT/33174/UEI](https://vipfarma.com.br/catalog/product_compare/add/product/33174/uei))

[f](#) [t](#) [in](#) [G+](#) [@](#)



(<https://api.whatsapp.com/send?phone=5511930256340&text=&source=&data=>)

DESCRIÇÃO CURTA



A administração contínua de Zoladex resulta na inibição da liberação do hormônio luteinizante (LH) pela glândula hipófise, o que leva a uma queda nas concentrações no sangue de testosterona nos homens e de estradiol nas mulheres. Em homens, por volta do 21º dia após a primeira injeção do depot,

4.5
Google
Avaliações do Consumidor

as concentrações de testosterona são reduzidas e permanecem suprimidas com o tratamento contínuo a cada 28 dias, com Zoladex 3,6 mg, e com o tratamento a cada 3 meses, com Zoladex LA 10,8 mg. Em mulheres, as concentrações de estradiol no sangue são suprimidas por volta do 21º dia após a primeira injeção do depot de Zoladex 3,6 mg e, com o tratamento contínuo a cada 28 dias, permanecem diminuídas a níveis comparáveis àqueles observados em mulheres na pós menopausa.

DETALHES



DETALHES COMENTÁRIOS

PARA QUE É INDICADO ZOLADEX?

Controle de câncer de próstata passível de manipulação hormonal;

Controle da endometriose (alteração do endométrio, membrana que reveste a parede do útero), com alívio dos sintomas, inclusive da dor, e redução do tamanho e do número das lesões endometriais;

Controle de leiomioma uterino (tumor uterino benigno), com redução do tamanho das lesões, melhora do estado hematológico da paciente e redução dos sintomas, inclusive da dor. É utilizado como adjuvante à cirurgia para facilitar as técnicas operatórias e reduzir a perda sanguínea durante a cirurgia.

Controle do câncer de mama passível de manipulação hormonal, em mulheres em pré e perimenopausa (período que antecede a menopausa).

COMO FUNCIONA ZOLADEX?

A administração contínua de Zoladex resulta na inibição da liberação do hormônio luteinizante (LH) pela glândula hipófise, o que leva a uma queda nas concentrações no sangue de testosterona nos homens e de estradiol nas mulheres. Em homens, por volta do 21º dia após a primeira injeção do depot, as concentrações de testosterona são reduzidas e permanecem suprimidas com o tratamento contínuo a cada 28 dias, com Zoladex 3,6 mg, e com o tratamento a cada 3 meses, com Zoladex LA 10,8 mg. Em mulheres, as concentrações de estradiol no sangue são suprimidas por volta do 21º dia após a primeira injeção do depot de Zoladex 3,6 mg e, com o tratamento contínuo a cada 28 dias, permanecem diminuídas a níveis comparáveis àqueles observados em mulheres na pós menopausa.

QUAIS AS CONTRAINDICAÇÕES DO ZOLADEX?

Zoladex é contraindicado para pacientes com hipersensibilidade (alergia) grave conhecida à goserrelina ou a qualquer componente do produto. Zoladex também é contraindicado para grávidas e lactantes.

PERGUNTE E VEJA OPINIÕES DE QUEM JÁ COMPROU



(<https://api.whatsapp.com/send?phone=5511930256340&text=&source=&data=>)

